


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Инструкция

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Энема Клин



Регистрационный номер: ЛП-000239

Торговое название препарата: Энема Клин

Лекарственная форма: раствор для ректального введения

Состав:

Один флакон (клизма) (120 мл) содержит:

действующие вещества: натрия гидрофосфата гептагидрат 7,2 г; натрия дигидрофосфата моногидрат 19,2 г;

вспомогательные вещества: фосфорная кислота q.s. до pH 5,0, натрия бензоат 0,48 г, вода до 120 мл.

Описание:

Прозрачный бесцветный раствор без запаха, не содержащий посторонних видимых включений.

Фармакотерапевтическая группа:

Слабительное средство

Код АТХ: А06АG01

Фармакологические свойства:

Энема Клин – солевое слабительное, действие которого основано на увеличении с помощью осмотических процессов задержки воды в просвете кишечника. Накопление жидкости в кишке приводит к усилению перистальтики и последующему очищению кишечника. Время наступления эффекта – 5-7 минут после введения.

Показания к применению:

- запор;
- подготовка к эндоскопическому исследованию прямой кишки;
- подготовка к рентгенологическому исследованию органов брюшной полости;

- подготовка к хирургическим операциям на органах брюшной полости, родам.

Противопоказания:

Индивидуальная гиперчувствительность, непроходимость кишечника, перфорация кишечника, острый геморрой, трещины заднего прохода, острые воспалительные и/или язвенные поражения *дистальных* отделов желудочно-кишечного тракта, детский возраст.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания:

Клинические исследования у беременных женщин не проводились, поэтому применение препарата не рекомендуется, и возможно по показаниям, когда потенциальная польза превышает риск применения.

Способ применения и дозы:

Ректально, по 120 мл (1 флакон).

Перед применением снять защитную пленку с флакона. Отвернуть защитный колпачок вместе с наконечником. Снять с флакона защитную пробку. Завернуть наконечник вместе с защитным колпачком, лечь на левый бок, согнув правую ногу в колене, снять защитный колпачок со смазанного наконечника флакона и аккуратно ввести наконечник в анальное отверстие, надавив с небольшим усилием в направлении пупка. Выдавить содержимое флакона и вынуть наконечник из анального отверстия. Необязательно выдавливать содержимое до конца, поскольку флакон содержит 15 мл избытка препарата. Рекомендуется удерживать препарат в кишечнике 8-10 минут. Рекомендуемое положение тела следует сохранять до наступления позывов к опорожнению.

Побочные действия:

Возможны аллергические реакции, тошнота, рвота, боли в животе, местнораздражающее действие (раздражение вокруг анального отверстия).

Если любые из указанных выше побочных действий появляются и усугубляются или Вы заметили другие побочные действия не указанные в инструкции, **сообщите об этом врачу.**

Передозировка:

Передозировка при ректальном способе введения маловероятна. Может наблюдаться диарея, нарушение водно-электролитного баланса, обезвоживание.

При первых признаках передозировки следует обратиться к врачу. Лечение симптоматическое: гидратационная терапия, противодиарейные средства.

Особые указания:

В случае появления тошноты, рвоты, болей в брюшной полости проконсультируйтесь с врачом.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не выявлено.

Однако следует проконсультироваться с врачом, если пациент принимает антикоагулянты, препараты дигиталиса, ципрофлоксацин, этидронат, полистиренсульфонат натрия или антибиотики тетрациклинового ряда.

Форма выпуска:

Раствор для ректального введения. По 120 мл в пластиковый флакон с пластиковым наконечником (клизма), снабженным односторонне-пропускающим клапаном и защитным колпачком. По 1 клизме в полиэтиленовом пакете вместе с инструкцией по применению в картонной пачке.

Условия хранения:

В сухом месте, при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности:

3 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска:

Отпускают без рецепта.

Владелец РУ и производитель:

Набикасим Индастриз (Пвт.) Лтд / Nabiqasim Industries (Pvt.) Ltd

509-510, 5-ый этаж, Коммерческий центр, Хасрат Мохани ул., Карачи-74200, Пакистан

Тел. + (92 21) 111742762

Адрес в РФ для предъявления претензий:

ООО «КДК-Фарм».

142407, Россия, Московская область, г. Ногинск, 1-й Кардолентный проезд, дом 5

Тел.: (496) 514-75-76.

Директор по регистрации
ООО «ФармаРег» (по доверенности)



МИНЗДРАВ РОССИИ
17 00029-25 04 16
СОГЛАСОВАНО

Прошито и пронумеровано и
скреплено печатью 4 листа(ов).
Должность Директор по регистрации
ФИО Чорич
Алена Валентиновна

(подпись)
М.П. «15» апреля 2016 года

